

给药方案

SUTAB是一种分剂量（2天）给药方案。为了完成结肠镜检查的准备工作，共需要服用24片药片。您将分两次服药，每次服用12片。每次服用SUTAB时都必须饮水，并且每次服用后都必须饮用额外的水。



第一天第一剂 – 结肠镜检查前一天晚上（下午6点）

我们建议您在服用SUTAB之前、期间和之后补充充足的水分。

用16盎司水吞服12片药片

在进行结肠镜检查的前一天，打开第一瓶12片药片，并按照如下所述服用SUTAB。

第1步 打开1瓶12片药片。取出并丢弃干燥剂。从第二个瓶子中取出并丢弃干燥剂，盖上瓶盖。在结肠镜检查当天早上，服用第二瓶第二剂。



第2步 将16盎司水倒入提供的容器中（至注水线）。



**每2分钟吞服1片。吞服每片药片时和吞服后要多喝水。
您应该在24分钟内吃完12片药片并喝完全部16盎司水。**



重要事项：如果您出现与准备工作相关的症状（例如恶心、腹胀或绞痛），请暂停饮用额外的水或减慢饮水速度，直到症状减轻。

喝另外两杯16盎司的水

第3步 服用最后一片药片后约1小时，再次将16盎司水倒入提供的容器（至注水线），并在30分钟内喝完所有水量。

第4步 喝完第二个容器中的水后约30分钟，将16盎司水倒入提供的容器（至注水线），并在30分钟内喝完所有水量。

第二天第二剂 – 结肠镜检查当天早上

用另外16盎司水吞服剩余12片药片

- 继续只进食清流质食物，直到结肠镜检查后。
- 重复进行“第一天第一剂”中的第2步至第4步。
- 如果您出现与准备工作相关的症状（例如恶心、腹胀或绞痛），请暂停饮用额外的水或减慢饮水速度，直到症状减轻。
- 在到达手术时间前至少两小时，服用所有SUTAB药片并喝水。

