



SUFLAVE给药方案

SUFLAVE是一种分剂量（2天）给药方案。为了完成结肠镜检查的准备工作，共需要服用2瓶药。您将分两次服用2瓶药。一剂SUFLAVE相当于一瓶药粉加一个增味包。

所示药瓶和增味包均非实际尺寸。

第一天第一剂：结肠镜检查前一天的傍晚

在下午6点开始服用第一剂。

第1步 打开1个增味包，将内容物倒入1个瓶子中。


第2步 在提供的瓶子中倒入温水至注水线。盖上瓶盖后，轻轻摇晃瓶子，直到所有粉末混合均匀（溶解）。为了获得最佳口感，请在饮用前将溶液冷藏一小时。不要冷冻。24小时内饮用完毕。

第3步 每15分钟喝8盎司溶液，直到喝完为止。

第4步 晚上再喝16盎司水。

重要事项：如果出现恶心、腹胀或腹部绞痛，请暂停饮用额外的水或减慢饮水速度，直到症状减轻。

2023年8月



所示药瓶和增味包均非实际尺寸。


第二天第二剂：结肠镜检查当天早上（到达手术时间前4小时）

在上午_____开始服用第二剂。

第1步 重复进行“第一天第一剂”中的第1步至第3步。

第2步 早上再喝16盎司水。

重要事项：继续只进食清流质食物，直到结肠镜检查。在到达结肠镜检查时间前至少2小时，停止饮用液体。



所示药瓶和增味包均非实际尺寸。

在到达检查时间前至少2小时，停止饮用液体。



请参见AdventHealth结肠镜检查准备指导，了解更多详情。