



SUFLAVE Regime de dosagem

SUFLAVE é um regime de dose dividida (2 dias). São necessários um total de 2 frascos para a preparação completa para colonoscopia. Você tomará 2 garrafas de líquido em duas doses separadas. Uma dose de SUFLAVE é igual a um frasco mais um sachê de intensificador de sabor.

Frascos e pacotes não mostrados em tamanho real.

Dia 1, dose 1: No início da noite antes da sua colonoscopia

Comece a Dose 1 às 18h.

- PASSO 1** Abra 1 pacote de intensificador de sabor e despeje o conteúdo em 1
- PASSO 2** Encha a garrafa fornecida com água morna até a linha de enchimento. Após tampar a garrafa, agite-a suavemente até que todo o pó esteja bem misturado (dissolvido). Para melhor sabor, leve a solução à geladeira por uma hora antes de beber. Não congelar. Use dentro de 24 horas.
- PASSO 3** Beba 236 ml (8 onças) de solução a cada 15 minutos até que a garrafa esteja vazia.
- PASSO 4** Beba mais 470 ml (16 onças) de água durante a noite.

IMPORTANTE: Se ocorrer náusea, inchaço ou cólicas abdominais, suspenda ou diminua a quantidade de bebida da solução e de mais água até que os sintomas diminuam.



Frascos e pacotes não mostrados em tamanho real.


Agosto de 2023

Dia 2, dose 2: Manhã da colonoscopia (4 horas antes da chegada para o procedimento)

Iniciar Dose 2 às _____ h.

- PASSO 1** Repita o passo 1 ao passo 3 do Dia 1, dose 1.
- PASSO 2** Beba mais 470 ml (16 onças) de água durante a manhã.

IMPORTANTE: Continue consumindo apenas líquidos claros até a colonoscopia. Pare de beber líquidos pelo menos 2 horas antes do horário de chegada para a colonoscopia.



Frascos e pacotes não mostrados em tamanho real.

Pare de beber líquidos pelo menos 2 horas antes do horário de chegada.



Consulte as Instruções de preparação para colonoscopia da AdventHealth para obter mais detalhes.

