

El día *antes* de su procedimiento...

Lo que **PUED**E hacer:

- Beba SOLO líquidos claros. NO coma ningún alimento sólido.
- Beba muchos líquidos claros antes y durante la preparación intestinal para ayudar a evitar la deshidratación.

Siga las instrucciones de preparación de AdventHealth para obtener más información.

Ejemplos de líquidos claros:

- Agua
- Jugos de fruta colados (sin pulpa) incluido jugo de manzana, naranja, uvas o arándanos blancos
- Limonada o "limada"
- Café o té (**NO use** ningún tipo de crema, ni láctea ni no láctea)
- Caldo de pollo
- Postres de gelatina sin agregado de frutas o glaseado (**QUE NO SEAN ROJOS NI PÚRPURA**)

Nota:

- El kit de preparación intestinal SUPREP está indicado para la limpieza del colon como preparación para una colonoscopia en adultos.
- Asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos herbales. El kit de preparación intestinal SUPREP puede afectar la acción de otros medicamentos.
- Los medicamentos orales pueden no absorberse correctamente si se toman dentro de la hora previa al inicio de cada dosis del kit de preparación intestinal SUPREP.
- Las reacciones adversas más comunes tras la administración del kit de preparación intestinal SUPREP fueron malestar general, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

SUPREP[®] BOWEL PREP KIT (sodium sulfate, potassium sulfate and magnesium sulfate) Oral Solution




El kit de preparación intestinal SUPREP es un régimen de dosis dividida (2 días). Se requieren ambos frascos de 6 onzas para una preparación completa.

PRIMERA DOSIS: Comience el Paso 1 a las 6 p. m. la noche anterior al procedimiento y proceda como se muestra a continuación:

Debe completar los pasos 1 a 4 usando una (1) botella de 6 onzas antes de acostarse:

PASO 1



Vierta **UN** (1) frasco de 6 onzas de SUPREP líquido en el vaso de mezclar

PASO 2



Agregue agua potable fría hasta la línea de 16 onzas del envase y mezcle.


NOTA: Diluya la solución concentrada según las instrucciones antes de usar.

PASO 3



Tome **TODO** el líquido del vaso.

PASO 4



Deberá tomar dos (2) vasos mas de 16 onzas de agua durante la hora siguiente.

SEGUNDA DOSIS: Comience el Paso 1 4 horas antes de la hora de LLEGADA (____AM) de su procedimiento y proceda como se muestra arriba:

Para estas dosis, repita los pasos 1 a 4 indicados anteriormente usando el otro frasco de 6 onzas.

NOTA: Debe terminar su último vaso de agua al menos 2 horas antes de la hora de llegada a su procedimiento.