

## O regime de dosagem

SUTAB é um regime de dose dividida (2 dias). São necessários 24 comprimidos para a preparação completa para colonoscopia. Você tomará os comprimidos em duas doses de 12 comprimidos cada. É necessário consumir água com cada dose de SUTAB, e mais água deve ser consumida após cada dose.



### Dia 1, dose 1 – Na noite anterior à colonoscopia (às 18h)

É recomendável que você **se hidrate adequadamente antes, durante e depois de tomar SUTAB.**

#### Engula os 12 comprimidos com os primeiros 470 ml (16 onças) de água

No dia anterior à sua colonoscopia, abra o primeiro frasco de 12 comprimidos e tome SUTAB conforme descrito abaixo.


**PASSO 1** Abra 1 frasco com 12 comprimidos. **Remova e descarte o dessecante. Remova e descarte o dessecante** do segundo frasco e feche o frasco. Use o segundo frasco para a segunda dose na manhã da colonoscopia.



**PASSO 2** Encha o recipiente fornecido com 470 ml (16 onças) de água (até a linha de enchimento).



Comprimidos não mostrados em tamanho real.



**Engula 1 comprimido a cada 2 minutos. Beba bastante água enquanto engole e depois de engolir cada comprimido. Você deve terminar os 12 comprimidos e os 470 ml (16 onças) de água em 24 minutos.**

**IMPORTANTE:** Se você apresentar sintomas relacionados à preparação (por exemplo, náusea, inchaço ou cólicas), pause ou diminua a quantidade de água adicional ingerida até que os sintomas diminuam.

#### Beba os dois copos adicionais de 470 ml (16 onças) de água

**PASSO 3** Aproximadamente **1 hora** após a ingestão do último comprimido, encha novamente o recipiente fornecido com 470 ml (16 onças) de água (até a linha de enchimento) e beba toda a quantidade ao longo de 30 minutos.

**PASSO 4** Aproximadamente **30 minutos** após terminar o segundo recipiente de água, encha o recipiente fornecido com 470 ml (16 onças) de água (até a linha de enchimento) e beba toda a quantidade ao longo de 30 minutos.


### Dia 2, dose 2 – A manhã da colonoscopia

(4 horas antes do horário de chegada para o procedimento)

#### • Engula os outros 12 comprimidos com outros 470 ml (16 onças) de água



Comprimidos não mostrados em tamanho real.



• Continue consumindo apenas líquidos claros até depois da colonoscopia.

• Repita os passos 2 a 4 do Dia 1, dose 1.

• Se você apresentar sintomas relacionados à preparação (por exemplo, náusea, inchaço ou cólicas), pause ou diminua a quantidade de água adicional ingerida até que os sintomas diminuam.

• Termine de tomar todos os comprimidos de SUTAB e água pelo menos duas horas antes do horário de chegada para o procedimento.