AdventHealth

SUTAB®

(sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de potasio) en pastillas
1.479 g/0.225 g/0.188 g

Pauta posológica

SUTAB es un tratamiento de dosis dividida (2 días). Se requiere un total de 24 pastillas para una preparación completa para la colonoscopia. Tomará las tabletas en dos dosis de 12 pastillas cada una. Debe beber agua con cada dosis de SUTAB y debe beber más agua después de cada dosis.

Día 1, dosis 1 – La noche anterior a la colonoscopia (a las 6 p. m.)

Le recomendamos que **se hidrate apropiadamente antes, durante y después de** tomar SUBTAB.

Trague las 12 pastillas con las primeras 16 onzas de agua

El día anterior a la colonoscopia, abra el primer frasco de 12 tabletas y tome SUTAB como se describe a continuación.

PASO 1 Abra 1 frasco de 12 pastillas. **Retire y deseche el desecante.** **Retire y deseche el desecante** del segundo frasco y ciérrelo. Utilice el segundo frasco para la segunda dosis la mañana de la colonoscopia.

PASO 2 Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado).

Trague 1 pastilla cada 2 minutos. Beba abundante agua mientras traga y después de tragar cada pastilla. Debe terminar las 12 pastillas y las 16 onzas de agua en 24 minutos.

Las pastillas no están representadas en su tamaño real.

IMPORTANTE: Si tiene síntomas relacionados con la preparación (por ejemplo, náuseas, hinchazón o cólicos), haga una pausa o beba lentamente después de cada dosis hasta que los síntomas disminuyan.

Beba 16 onzas de agua dos veces más

PASO 3 Aproximadamente **1 hora** después de tomar la última pastilla, llene nuevamente el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba todo en 30 minutos.

PASO 4 Aproximadamente **30 minutos** después de terminar el segundo recipiente de agua, vuelva a llenar el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba todo en 30 minutos.

Día 2, dosis 2 – La mañana de la colonoscopia

(4 horas antes de la hora de llegada para el procedimiento)

Trague las otras 12 pastillas con otras 16 onzas de agua

Las pastillas no están representadas en su tamaño real.

- Siga ingiriendo solo líquidos claros hasta después de la colonoscopia.
- Repita los pasos 2 a 4 del día 1, dosis 1.
- Si tiene síntomas relacionados con la preparación (por ejemplo, náuseas, hinchazón o cólicos), haga una pausa o beba lentamente después de cada dosis hasta que los síntomas disminuyan.
- Termine de tomar todas las tabletas de SUTAB y el agua al menos dos horas antes de la hora de llegada para el procedimiento.